

IHRE PATIENTEN SIND NUR 3 WOCHEN ENTFERNT VON EINER VOLLSTÄNDIGEN GRUNDIMMUNISIERUNG GEGEN FSME*



FSME: Frühsommer-Meningoenzephalitis. GI: Grundimmunisierung. *Bei Anwendung des Express-Schemas^{1,2} Tag 0,7,21. ¹Encepur[®] Erwachsene Fachinformation, Stand 04.2025. ²Encepur[®] Kinder Fachinformation, Stand 06.2025.


Encepur[®] Kinder und Encepur[®] Erwachsene. Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)- Impfstoff (inaktiviert), Injektions suspension in einer Fertigspritze. Wirkstoff: Inaktiviertes FSME-Virus, Stamm K23 **Zusammensetzung:** Eine Dosis (0,5ml-Erwachsene; 0,25ml-Kinder) enthält inaktiviertes Virus, Stamm K23, 0,75 µg (Encepur[®] Kinder) oder 1,5 µg (Encepur[®] Erwachsene). Aluminiumhydroxid (0,15-0,2 mg (Encepur[®] Kinder) oder 0,3-0,4 mg (Encepur[®] Erwachsene) Al3+).

Sonstige Bestandteile: Trometamol, Saccharose, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke, Spuren von Formaldehyd, Chlortetracyclin, Gentamicin und Neomycin, kann Rückstände von Eiern und Hühnerproteinen enthalten. **Indikation:** Aktive Immunisierung von Personen 1-11 Jahren (Encepur[®] Kinder) und ≥12 Jahren (Encepur[®] Erwachsene) gegen FSME. **Gegenanzeigen:** Bekannte Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Personen mit andauernden akuten behandlungsbedürftigen Erkrankungen. Eine mit einer Komplikation verlaufenden Impfung mit dem gleichen Impfstoff bis zur Klärung der Ursache. **Nebenwirkungen: Encepur[®] Kinder: Sehr häufig** Kopfschmerzen (Kinder ≥ 3 Jahre), Schläfrigkeit (Kinder < 3 Jahre), Schmerzen an der Injektionsstelle, Fieber >38°C (Kinder 1-2 Jahre). **Häufig:** Übelkeit, Arthralgie, Myalgie, Erythem und Ödem an der Injektionsstelle, Fieber >38°C (Kinder 3-11 Jahre), grippeähnliche Beschwerden. Unwohlsein, Lethargie **Selten:** Durchfall, Erbrechen. **Encepur[®] Erwachsene: Sehr häufig:** Schmerzen an der Injektionsstelle, Myalgie, Kopfschmerzen, Unwohlsein. **Häufig:** Erythem oder Ödem an der Injektionsstelle, Fieber >38°C, Übelkeit, Arthralgie, grippeähnliche Beschwerden. **Gelegentlich:** Erbrechen. **Verschreibungspflichtig. Inhaber der Zulassung:** Bavarian Nordic, Philip Heymans Alle 3, 2900 Hellerup, Dänemark. **Stand der Fachinformation Encepur[®] Erwachsene: April 2025. Stand der Fachinformation Encepur[®] Kinder: Juni 2025.** Nebenwirkungsmeldungen richten Sie sie ggf. an: drug.safety@bavarian-nordic.com.



Erfahren Sie mehr über das Encepur® Express-Schema und den Nutzen für Ihre Patienten

SCHNELLER, LANGFRISTIGER IMMUNSCHUTZ MIT ENCEPUR®



*Die Intervalle für die Auffrischimpfung sind auf den individuellen Immunstatus u. klinischen Zustand des Patienten abzustimmen u. vom behandelnden Arzt festzulegen; sie betragen gemäß Zulassung 5-10 Jahre für Patienten im Alter von 12-49 Jahre. Diese Intervalle gelten nach dem 1. Booster mit Encepur® Erwachsene, der abhängig vom Impfschema 12 Monate bis 3 Jahre nach Abschluss der GI zu geben ist. **Das Konventionelle Schema ist das bevorzugte Impfschema bei Personen, die einem kontinuierlichen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Für Personen, die eine schnelle Immunisierung benötigen, bietet Encepur® ein Express-Schema mit 3 Impfstoffdosen innerhalb von 3 Wochen zur vollständigen GI. Gendgerechte Sprache: Dieser Text schließt prinzipiell alle Geschlechter mit ein. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch nur eine Geschlechtsform verwendet.

Encepur® Kinder 1 - 11 Jahre

PZN
 16632647 - 1 ST
 16632676 - 10 ST
 16632682 - 20 ST

Ab 12 Jahren

Encepur® Erwachsene

PZN
 16632618 - 1 ST
 16632624 - 10 ST
 16632630 - 20 ST



Der Umwelt zuliebe in plastikfreien Großpackungen verordnen!

